

Брянский лес (Брянская область)

По материалам походов 2-8 мая 2005 и 16-20 сентября 2009.

Маршрут 2005: Ст. Навля – вдоль р.Навля – р.Гбень – р.Крапивна – с.Глинное – р.Коломина – д.Гуры – р.Десна – р.Бетча – р.Солька – ур.Земляное – д.Стеклозное – ст.Кокоревка – (переезд) – ст.Синезерка – р.Ревна – д.Кольцовка – ст.Синезерка. Около 90 км. Состав: М.Чертопруд, В.Марьинский, А.Храмов, И.Рыбаков.

Маршрут 2009: ст. Навля – вдоль р.Навля – р.Гбень – п.Алтухово – р.Крапивна – брод р.Навля – д.Думча – д.Пашеньки – р.Волковка – ЛЭП – р.Ревна – хут.Малиновка – р.Десна – ст.Выгонищи. Тоже около 90 км. М.Чертопруд, Д.Палатов, В.Марьинский.

Краеведческое описание

Ландшафт. Климатически – зона широколиственных лесов; действительно, от Навли начинается огромный лесной массив, тянущийся на юго-запад почти на сто километров, до границы с Украиной, и включающий в себе заповедник «Брянский лес». Но геологически это задровая низменность, типа Мещеры – плоская, с песчаными почвами, и заросла она преимущественно сосной. Километрами тянутся сосняки, в основном сажные после вырубок, различного возраста; в болотистых понижениях преобладают березы. Речки с низкими долинами, но очень широкими поймами (до километра у малых рек и 3-5 километров у Навли). Поймы в основном выполнены черноольшаником, черемухой и т.п. – то есть изрядно заболочены, с массой придаточных водоемов. А елки и широколисты – только в примеси, местами, в основном у края долин. Наиболее значимое исключение – лес в низовьях Бетчи близ Десны – заболоченный ельник с кочками; и на гривах вдоль этой поймы тоже много елок.

Населенность. Низкая. Свежих вырубок относительно мало, и они не носят километровых масштабов, хотя это еще не заповедник. Дорог в целом достаточно – в сосняках они прокладываются легко, а зарастают медленно, поэтому их сеть развита на любой вкус. Поселков в лесу нет; немногие ближайшие деревни располагаются вдоль крупных рек и железной дороги. Наиболее крупный встретившийся нам антропогенный объект – мемориальный комплекс на р.Бетче, на месте расположения штаба партизанской бригады в 1942-1944гг. Они там жили почти два года, судя по описанию, огромным лагерем (со своей типографией, аэродромом, прачечной и даже райкомом КПСС. А теперь живых людей в этом лесу практически нет. Многие деревни в этом лесу (даже обозначенные на карте) практически не

жилые, и даже мост через Навлю в районе Алтухово давно разрушен. К северу от р.Навли цивилизация оживленнее, несколько дорог покрыты свежим асфальтом; но другие, наоборот, зарастают. Между Навлей и Ревной часть дорог явно военного назначения; но они как раз заброшены. В целом даже удивительно, какой большой лес сохранился почти на украинской границе.



Речка Крапивна



Белый гриб – царь подстилки

Водоемы и влажность. По весеннему времени, воды хватает; и только в гуще сосняков иной раз можно долго не встретить приличных водоемов. Лес порождает изрядно мелких, но светлых, чистых и вполне постоянных речек (Гбень, Речица, Крапивна, Железна), а вдоль них – достаточно разных луж, болот и проток. С виду – не суше, чем в Подмосковье. В начале осени практически все болота могут пересохнуть, и остаются только речки (видимо, с довольно мощным родниковым питанием).

Более крупные речки (Навля и Ревна, шириной 10-20 метров) имеют типичный равнинный характер, с песчаным дном, светлой тихой водой и береговой полосой вяких макрофитов. При необходимости в межень легко преодолеваются вброд (ниже пояса). Десна в этом районе имеет ширину 50-70 метров, глубокая, мощная и довольно загрязненная после Брянска, также с песчаным дном и береговыми макрофитами.



Река Навля



И ее старичное озерко

Реофильная фауна. В малых реках и ручьях – типична для равнинных водотоков с мягкими субстратами. Преобладают *Nemoura cinerea*, *Baetis* spp., *Limnephilidae* spp., *Asellus aquaticus*, *Gammarus lacustris* (обилие последнего, видимо, вообще типично для юга средней полосы, в отличие от Подмосковья) . На корягах также вполне типичный ксилофильный комплекс (*Hydropsyche*, *Lype*, *Elmidae*, *Atherix*, *Simuliidae*, *Ancylus*). В береговых заиленных макрофитах много улиток; на омываемых заметным течением преобладают *Simuliidae* и *Baetis*. Довольно интересны сообщества промытого песка – кроме разреженных горошинок, олигохет и хирономид, в них довольно массово встречается редкая роющая веснянка *Isoptena serricornis*. Наконец, в подпруженном участке р.Речица впервые для черноземья встречена стрекоза *Cordulegaster boltonii*.

В реках классом выше (Десна, Навля и Ревна) развито мощное фитофильное сообщества прибрежных макрофитов (на слабом течении – с доминированием улиток, на сильном – *Simuliidae*, *Brachycentrus*, *Hydropsyche*, *Baetis*); пелофильное сообщество прибрежных заиленных грунтов (*Lithoglyphus*, *Viviparus*, *Unio*, *Rivicoliana*, *Euglesidae*, *Chironomidae*, *Tubificidae*) и довольно бедное псаммофильное сообщество промытого песка (*Hexatoma*, *Tubificidae*). Каменистые перекаты найдены только в р.Ревка у пл.Синезерки (*Theodoxus*, *Baetis*, *Hydropsyche*). Наиболее заметное отличие от рек Подмосковья – массовое внедрение на илистые грунты понтоткаспийской улитки *Lithoglyphus naticoides* и ее доминирование в этих биотопах (только в загрязненной Десне, как и в р.Москве, преобладает *Viviparus viviparus*). Из других южных улиток найден только *Theodoxus fluviatilis*.



Черноольховая пойма р.Речица



В тростниковой пойме Десны

Лимнофильная фауна. Довольно богатая фауна пойменных луж; кроме того, изучена пара крупных прудов, где зарослевая фауна с заметным южным уклоном (*Corixa*, *Ranatra*). Пойменные озерки весной находятся в состоянии паводка; к осени же изрядно подтоухают, и получается не очень удобно. Интересно, что в пойменных водоемах на Навле встречается в общем ручьевого бокоплав *Stygobromus meschtschericus*; преобладают устойчивые к

заморам водяной ослик *Asellus aquaticus* и катушка *Planorbis planorbis*. Старицы Десны тоже тухловаты, богаты улитками, олигохетами, осликом и прудовой поденкой *Cloeon dipterum*.

Млекопитающие. Нормальная лесная фауна средней полосы. Постоянно встречаются следы кабана и лося; нередко на ручьях – постройки бобра (хотя меньше, чем в подмосковной Мещере).

Сезонная специфика. Начало мая – одно из лучших времен для путешествий по средней полосе – тепло, день длинный, а комары еще не вывелись, и трава высокая в поймах не выросла (поэтому можно относительно легко перемещаться даже по черноольшанику). Кроме того, очень красиво – все свежее, мокрое, первоцветы в поймах цветут (в сосняках, напротив, еще серовато), и птицы поют. Но – еще много воды, на более крупных реках (Десна, Навля) еще не кончилось наводнение, мосты и часть пойм затоплено; поэтому и исследовать эти реки практически не удалось. Летом здесь заведомо полно комаров, а в сырых поймах еще и трава по уши.

В сентябре тоже неплохо – тепло, сухо и почти нет комаров. Раздражает только высокий бурьян на заброшенных просеках и не менее высокая крапива в пойменных низинах. Поймы сильно зарастают, дорог в них практически нет, и пройти, например, вдоль южного берега Навли становится довольно тяжело. В пойме Десны тоже очень высокая трава вперемешку с ивняком. Зато в реках копаться удобно, и форсировать их тоже.